

Cocciniglia dai filamenti cotonosi (*Takahashia japonica*)



Ovisacchi dall'aspetto cotonoso di Takahashia japonica (Foto di: Servizio Fitosanitario della Regione Lombardia)

La *Takahashia japonica* è una **cocciniglia di origine asiatica**, originaria del Giappone e diffusa anche in Cina, Corea del Sud e India; la presenza in Lombardia è stata segnalata solo da alcuni anni.

È facilmente riconoscibile durante la fine del periodo riproduttivo dai caratteristici **ovisacchi bianchi dall'aspetto cotonoso**, tubolari, formanti anelli lunghi da 4 a 5 cm di colore bianco: l'insetto si riproduce una sola volta all'anno verso fine aprile inizio maggio.

Interessa prevalentemente alberature di una stessa specie disposte in filari lungo la strada e quindi questa cocciniglia si riscontra per lo più su alberi ornamentali decidui come aceri, carpini, gelsi, bagolari, liquidambar. **Non risultano al momento conseguenze per animali ed esseri umani.**

Regione Lombardia, che monitora la diffusione dell'insetto, fornisce informazioni ed indicazioni sulla pagina del **Servizio Fitosanitario Regionale**.

Il Comune di Varedo ha avviato specifici interventi di contenimento della diffusione della cocciniglia sul patrimonio arboreo pubblico infestato; nei casi più gravi potrà essere valutata la potatura dei rami maggiormente disseccati o infestati. Ogni intervento deve essere valutato rispetto alle restrizioni all'uso dei prodotti fitosanitari in ambito urbano e di tutela delle api e degli insetti pronubi, essendo la primavera periodo di fioritura e fruttificazione. La cocciniglia, infatti, produce una melata zuccherina che attira le api e una sua eventuale contaminazione potrebbe essere altamente nociva per gli insetti impollinatori.

Si invita la cittadinanza a segnalare i casi di *Takahashia japonica* rilevati in ambito pubblico al seguente indirizzo e-mail lavoripubblici@comune.varedo.mb.it e al Servizio Fitosanitario Regione Lombardia mediante l'app FitoDetective.